

C1

ฉบับที่ 23,953 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หน้า 22



ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง คามพระราชดำริบ้านแปกแซม ตำบลเปียง หกวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มี การส่งเสริมสนับสนุนเกษครกรในพื้นที่โครง กรทำการเกษตรในหลากหลายชนิดพืชและ วิธีการปกก

และหนึ่งในนั้นที่กำลังได้รับความนิยม ากสับริโภค คือการปลูกมะเงื่อเทศแบบ ปัดระบบอินทรีย์ภายในถุง ซึ่งเจ้าหน้าที่ โดรงการแนะนำว่าหากสนใจจะปลูก มะเขือเทสขั้นต้นต้องเข้าใจว่า ดินที่ เหมาะสมต่อการปลุกมะเขือเทสมากที่สุด นั้นเป็นดินร่วนปนทราย ที่มีอินทรียวัตถุ สุง และมีการระบายน้ำดี ความเป็นกรด เป็นด่างของจินประมาณ 4.5-6.8 ถ้าคิน เป็นกรจหรือเป็นด่างมากเกินไป จะ ทำให้ลิ่มขาดธาตุอาหารบางอย่างได้ หรือ หลุงเหารบางชนิดสามารถละลายออก มาใต้มากเกินไป จนเป็นเหตุให้เป็นพืช ต่อพืช


กวรมีการกำจัดวัชพืชออกหมด เพราะวัชพีชจะไปแย่งกินน้ำ-อาหาร-แสงแดด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของ โภและแบลงศัตรูพืชได้ ดังนั้นถ้ามี การเครียนดินดีนับตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จะช่วย เสียนไว้



ช้องกับให้วัชพีซงอกช้าลง จากนั้นตากแดดไว้ นาน 20 นาที นำเมล็ดมาวางในกระดาษเพาะ 25–30 วัน หากมีการเคลื่อนข้ายดันกล้าจาก 30-45 วัน มะเขือเทศจะเริ่มออกดอก และ ที่ดินแห้ง 3-4 อาทิตย์ แล้วนำมาใส่ถุงปถูกที่ กล้าหรือผ้าขาวบางชุบน้ำหมาด ๆ แล้วจึงห่อ โรงเรือนไปแปลงเพาะปถูกที่มีระยะห่างกัน เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 70-90 วัน การเก็บเกี่ยว

ส่วนค้นกล้าใช้วิธีเพาะเมล็ดในถาด พลาสติกใสหรือถุงใส่แกง เก็บในที่อุณหภูมิ ก่อนปลูก 2 วัน กวรรดน้ำในถุงปลูกให้ชุ่ม ไม่แก่จัดจะทำให้ทนทานต่อการขนส่ง และ Imะ ขนาด 104 หลุมต่อถาด นำเมล็ดพันธุ์แช่ 28–30 องศาเซลเซียส โดยใส่ในภาษนะที่ และข้ายกล้าในช่วงเย็น เพราะอากาศไม่ร้อน เมื่อถึงมือผู้บริโภคหรือวางขายในตลาดก็จะ ใหม่าสะอาด โดยให้เบถ็จทุกส่วนถูกน้ำ แช่ มิดชิด เช่น กระติกน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิ นาน แดดไม่จัด ตอนนี้ต้องระวังอย่าให้วัสดุเพาะ เริ่มสุกพอดี.

ข้ายกล้าเมื่อมีใบแท้ 4-5 ใบ หรืออายุไม่เกิน



ก 15897

แดกหรือรากขาด เพราะจะทำให้ด้นกล้า ชะงักการเจริญเติบโด เวลาย้ายต้นกล้างาก ถาดเพาะลงถุงปลูกให้จับบริเวณปลายขอด ไม่กวรกึงหรือบีบบริเวณโกนต้นกลบดิน ครอบกลุมโดนต้นกล้า

จากนั้นรดน้ำทุกวันเช้าเย็น ด้วย มะเขือเทสเป็นพืชที่ด้องการน้ำสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลเริ่มแก่ (ผล เปลี่ยนซี) หลังจากนั้นควรลดการให้น้ำลง มิฉะนั้นอาจทำให้ผลแตกได้ และกวรมีการ ประบาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาเพาะใน ปักก้างให้บะเงือเทส โดยใช้ไม้หลักปัดก้างค้น ก่อนระยะออกดอก ใช้เชือกผูกกับถำด้นให้ไขว้ เมื่อเมล็ดงอกก็กัดค้นกล้าโดยเอาด้น กันเป็นเลข8 และผูกเงื่อนกระตุกกับก้าง เพื่อ ที่แข็งแรงและโคสน้ำเสมอได้ดาบอายุ ตรงตาม ให้ดับแจริญเดิบโตได้ดี สะควกต่อการดูแลรักษา ลักษณะสายพันธุ์ ปราสจากโรคและแมลง ควร และผลไม่สัมผัสดิน สะตวกต่อการเก็บเกี่ยว

และโดยเฉลี่ยเมื่อย้ายปลูกได้ประมาณ เมล็ดด้วยกระดาษเพาะเมล็ดอีกครั้ง ด้วยถุง มาก กวรพักด้แกล้าก่อนปลูกอย่างน้อย 1 วัน ต้องให้ขั้วผลติดมาด้วย เพราะผลในระยะที่